

ПОДГОТОВКА К ДИАГНОСТИЧЕСКИМ ИССЛЕДОВАНИЯМ (ЭНДОСКОПИЧЕСКОМУ, РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОМУ И ДРУГИМ) И ОПЕРАТИВНЫМ ВМЕШАТЕЛЬСТВАМ, ТРЕБУЮЩИМ ОПОРОЖНЕНИЯ КИШЕЧНИКА¹⁻⁵

От качества подготовки кишечника зависит успех проводимого исследования/операции, то есть точность постановки диагноза и скорость реабилитации. Поэтому важно тщательно следовать указанным шагам и рекомендациям по приёму препарата.

КАЧЕСТВЕННАЯ ПОДГОТОВКА КИШЕЧНИКА – ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПАЦИЕНТА!

1 шаг. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП – РАЦИОН ПИТАНИЯ²⁻⁵

В течение 3 дней до процедуры ^{1,2-5}	РАЗРЕШЕНО:	ЗАПРЕЩЕНО:
	<ul style="list-style-type: none"> Яйца, сыр, сметана, сливочное масло, йогурт и кисломолочные продукты без добавок и наполнителей Мясо, птица и рыба нежирных сортов (в отварном, паровом или тушёном виде) Сахар, мёд (не в сотах) Бульоны (прозрачные, процеженные), сок без мякоти, чай, вода, безалкогольные неокрашенные напитки <p>Разрешённые продукты и жидкости не должны содержать мелкие косточки, зёрна, семена, отруби</p>	<ul style="list-style-type: none"> Все хлебобулочные, мучные и макаронные изделия Овощи, в том числе картофель, зелень, грибы, морская капуста Крупы, каши, бобовые, злаковые, орехи, семечки, кунжут, мак, зёрна, отруби и другие семена, специи Жёсткое мясо с хрящами, сосиски, колбасы, консервы, морепродукты Фрукты, ягоды, в том числе сухофрукты, варенье, джем, мармелад, желе Чипсы, гамбургеры, шоколад Алкоголь, газированные напитки, кофе, компот, кисель, молоко <p>Любые другие продукты и жидкости, не входящие в список разрешённых</p>

2 шаг. ВЫБОР СХЕМЫ ПРИЕМА^{1,5}

ЕСЛИ ВЫ ГОТОВИТЕСЬ К ИССЛЕДОВАНИЮ		
<input type="checkbox"/>	Исследование 08:00 – 10:00 Схема приёма МОВИПРЕП® : одноэтапная вечерняя**	<input type="checkbox"/>
<p>День накануне исследования: Завтрак: согласно списку разрешённых продуктов и жидкостей Обед и ужин: только разрешённые прозрачные жидкости 19:00 – 20:00 принять первый литр раствора препарата МОВИПРЕП® 20:00 – 20:30 выпить 500 мл разрешённой жидкости 21:00 – 22:00 принять второй литр раствора препарата МОВИПРЕП® 22:00 – 22:30 выпить 500 мл разрешённой жидкости</p>	<p>День накануне исследования: Завтрак и лёгкий обед: согласно списку разрешённых продуктов и жидкостей Ужин: только разрешённые прозрачные жидкости 20:00 – 21:00 принять первый литр раствора препарата МОВИПРЕП® 21:00 – 21:30 выпить 500 мл разрешённой жидкости День исследования: 06:00 – 07:00 принять второй литр раствора препарата МОВИПРЕП® 07:00 – 07:30 выпить 500 мл разрешённой жидкости</p>	<p><input type="checkbox"/> Исследование 14:00 – 19:00 Схема приёма МОВИПРЕП®: одноэтапная утренняя**</p> <p>День накануне исследования: Завтрак, обед и лёгкий ужин: согласно списку разрешённых продуктов и жидкостей День исследования: С утра: только разрешённые прозрачные жидкости 08:00 – 09:00 принять первый литр раствора препарата МОВИПРЕП® 09:00 – 09:30 выпить 500 мл разрешённой жидкости 10:00 – 11:00 принять второй литр раствора препарата МОВИПРЕП® 11:00 – 11:30 выпить 500 мл разрешённой жидкости</p>
<input type="checkbox"/> ЕСЛИ ВАС ГОТОВЯТ К ОПЕРАЦИИ***		
Схема приёма МОВИПРЕП® : только одноэтапная вечерняя**		
<p>День накануне операции: Завтрак: согласно списку разрешённых продуктов и жидкостей Обед и ужин: только разрешённые прозрачные жидкости</p>	<p>19:00 – 20:00 принять первый литр раствора препарата МОВИПРЕП® 20:00 – 20:30 выпить 500 мл разрешённой жидкости</p>	<p>21:00 – 22:00 принять второй литр раствора препарата МОВИПРЕП® 22:00 – 22:30 выпить 500 мл разрешённой жидкости</p>

* При хронических запорах рацион питания нужно соблюдать в течение 5 дней. За 3–5 дней до процедуры начать или продолжить приём слабительных препаратов по рекомендации врача-гастроэнтеролога.

** Время приёма препарата **МОВИПРЕП®** корректируется специалистом.

*** Подготовка к операции осуществляется после консультации специалиста

3 шаг. ПРИЁМ ПРЕПАРАТА МОВИПРЕП®

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПЕРВОГО ЛИТРА РАСТВОРА ПРЕПАРАТА:

1. Содержимое одного пакетика (саше) А и одного саше Б полностью растворить в небольшом количестве питьевой негазированной воды комнатной температуры.
2. Довести объём раствора до 1 литра водой.
3. Хорошо перемешать.



ПРИГОТОВЛЕНИЕ ВТОРОГО ЛИТРА РАСТВОРА ПРЕПАРАТА:

Повторить алгоритм, используя оставшиеся саше А и Б.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИЁМУ РАСТВОРА ПРЕПАРАТА¹⁻³:

- С момента начала приёма МОВИПРЕП® не следует употреблять твёрдую пищу. Приготовленный раствор препарата МОВИПРЕП® не заменяет регулярное потребление жидкости, поэтому необходимо поддерживать достаточный уровень жидкости в организме.
- Уменьшать объём воды для приготовления раствора препарата МОВИПРЕП® и дополнительной разрешённой жидкости нельзя.
- Раствор препарата принимать дробно, по 250 мл каждые 15 минут.
- Во время приёма раствора препарата нужно соблюдать двигательную активность: ходить, выполнять круговые движения корпусом, наклоны в стороны, вперёд-назад, приседания.
- Начало действия препарата индивидуально: в среднем через 1–2 часа от начала приёма появляется первый стул.
- Действие препарата продолжается индивидуально: в среднем в течение 2 часов.
- К моменту окончания подготовки стул должен измениться на прозрачную бесцветную или слегка окрашенную жидкость, что свидетельствует о готовности к процедуре.
- Не требуется дополнительно проводить очищение клизмами.
- При подготовке к колоноскопии окончить приём МОВИПРЕП® необходимо за 2–4 часа до начала процедуры.
- При подготовке дома необходимо рассчитать соответствующий временной интервал для поездки в клинику.

ОСОБЫЕ СЛУЧАИ:

- При наличии сопутствующих заболеваний следует обязательно проконсультироваться с лечащим врачом.
- Если Вы принимаете какие-либо лекарства, обязательно скажите об этом лечащему врачу перед приемом препарата МОВИПРЕП®. Лекарственные препараты, принятые перорально в течение одного часа до начала слабительного действия препарата (например, оральные контрацептивы), могут быть выведены из ЖКТ, не абсорбируясь.
- Пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, повышенной массой тела, сахарным диабетом не требуется коррекции дозы.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Гиперчувствительность к любому из компонентов препарата; нарушение опорожнения желудка (гастропарез); кишечная непроходимость; перфорация или риск перфорации органов ЖКТ; фенилкетонурия (из-за содержания в составе аспартама); дефицит глюкозо-6-фосфат дегидрогеназы (из-за содержания в составе аскорбиновой кислоты); токсический мегакolon, являющийся осложнением тяжелых воспалительных заболеваний кишечника, включая болезнь Крона и язвенный колит; возраст до 18 лет; бессознательное состояние.

Обязательно проконсультируйтесь со своим лечащим врачом перед применением препарата.



MOVIPREP.RU

Больше информации на сайте



Смотрите видео: Всё о диагностике колоректального рака и процедуре колоноскопия



Смотрите видео: Рекомендации по подготовке к процедуре колоноскопии

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ И ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ВРАЧОМ